

NÁVOD K POUŽITÍ

POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN - BIOAGENS

!!! Před použitím prostředku si přečtěte tento návod k použití !!!

Obchodní název prostředku:

IMUNO FLY TrichoE

Určený účel použití:

bioagens (pomocný prostředek pro ochranu rostlin) pro ekologickou likvidaci vajíček škůdců entomofágním hmyzem *Trichogramma evanescens* (Drobněnka vejcožravá)

Způsob působení:

Drobněnky nacházejí vejíčka škůdců a kladou do nich vejíčka, čímž škůdce ničí v zárodku. Ničí škůdce *Ostrinia nubilalis* (Zavíječ kukuřičný), *Autographa gamma* (Kovolesklec gama), *Helicoverpa armigera* (černopáska bavlníková) a další škůdce z řádu *Lepidoptera* (motýli), ve vývojové fázi (vejce).

Typ pomocného prostředku a typ působení pomocného prostředku: bioagens s živými mikroorganismy

Název a množství účinné látky v balení: *Trichogramma evanescens*, 3 milióny ks (+/- 10%) v 30 g balení

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 848/2018 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

SP1 Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

Pomocný prostředek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, vodních organismů, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. Pomocný prostředek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Držitel povolení / Distributor: IVT IMUNO, s.r.o., Pavlovická 12/59, 772 00 Olomouc, CZ

Tel.: **800 100 217** (po –pá.: 7.30 – 15.00), **info@ivtimuno.com**

Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení pomocného prostředku na trh:

IVT IMUNO, s.r.o., Pavlovická 12/59, 772 00 Olomouc, CZ

Označení pomocného prostředku: **IMUNO FLY TrichoE** (*Trichogramma evanescens*)

Evidenční číslo pomocného prostředku: 1867-0B

Číslo šarže: uvedeno na obalu/etiketě

Datum výroby formulace: uvedeno na obalu/etiketě

Doba použitelnosti (EXP): uvedeno na obalu/etiketě

Množství pomocného prostředku v obalu: 3 mil. *Trichogramma evanescens* (+/- 10%)

Použití:

Plodina, oblast použití	Škůdci	Dávkování, mísitelnost	Způsob aplikace	Interval mezi aplikacemi	Roční max. počet aplikací	Ochranná lhůta
Kukuřice setá Kukuřice cukrová	zavíječ kukuřičný, černopáska bavlníková	150.000 – 300.000 bioagens/ha	rozhoz / letecky	7-14 dní	2-3	nestanovena
Zelenina	můra kapustová, černopáska bavlníková	200.000 – 350.000 bioagens/ha	rozhoz / letecky	7-14 dní	2-3	nestanovena
Zelenina košťálová	můra zelná	100.000 – 150.000 bioagens/ha	rozhoz / letecky	7-14 dní	2-3	nestanovena
Zelenina plodová	zavíječ kukuřičný, černopáska bavlníková	200.000 – 350.000 bioagens/ha	rozhoz / letecky	7-14 dní	2-3	nestanovena
Fazol	černopáska bavlníková	100.000 – 150.000 bioagens/ha	rozhoz / letecky	7-14 dní	2-3	nestanovena

Podmínky aplikace: rozhoz / letecká aplikace bioagens se provádí ve dvou fázích: na začátku kladení vajec hlavních druhů škůdců a s nástupem hromadného kladení vajec. Dávkování v předepsané koncentraci (viz tabulka výše) se může lišit v závislosti na rozsahu počtu škůdců ošetřované plochy (ha). Bioagens je před aplikací ředěno pšeničnou krupicí (jemná dehydratovaná) v množství odpovídající navrženému dávkování a technickým parametrům použitého zařízení pro aplikaci. Opakovaná aplikace se provádí po 7-14 dnech.

Čištění zařízení pro aplikaci pomocného přípravku: použité zařízení několikrát propláchněte čistou vodou

Informace o první pomoci: bioagens není zdraví nebezpečné, bez negativního vlivu na životní prostředí. V případě alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc

Skladování: při teplotě +2 až +3 C° po dobu 30 dní a vlhkosti 80%, ve vychlazeném stavu + 10 až + 15 C° stupňů lze skladovat 2-3 dny, poté se bioagens ožíví. Skladujte samostatně, odděleně od ostatních prostředků. Vyhněte se přímému slunečnímu záření. Skladujte mimo dosah dětí.

Likvidace obalů a zbytků: obal na jedno použití, likvidujte jako běžný komunální odpad

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí: nejsou stanovena

Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nebo distributora nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím pomocného prostředku výrobce ani distributor neručí.